Calf Lyte® PLUS

ES / PT

COMPOSICIÓN / COMPOSIÇÃO:

Dextrose / Dextrose	60,5%
acetato de sodio / acetato de sódio	18,3%

Cloruro de potasio, cloruro de sodio, fosfato monosódico, fosfato dipotásico, proteína de leche en polvo (incluyendo lactoferrina 0,1%), azúcar caramelizada. Hidratos de carbono fácilmente digestibles: Dextrosa.
Cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato monossódico, fosfato dipotássico, proteína de leite em pó (incluindo lactoferrina 0,1%), açúcar caramelizado. Hidratos de carbono facilmente digeríveis: Dextrose.

COMPONENTES ANALÍTICOS / CONSTITUINTES ANALÍTICOS:

Azucares totales / total de açucares	60,5%
Ceniza bruta / cinza bruta	17,7%
Proteína bruta / proteína bruta	12%
Sodio / sódio	5,9%
Cloruros / cloretos	2,8%
Potasio /potássio	1,7%
Aceite y grasas brutos / gordura bruta	0,5%
Fibra bruta / fibra bruta	0,5%

ADITIVOS / ADITIVOS:

Aromatizantes: Glicina (2b17034) 90400 mg/kg
Aromatizantes: Glicina (2b17034) 90400 mg/kg

VALOR ENERGÉTICO / VALOR ENERGÉTICO: 326 kcal/100g

Condiciones de conservación: Mantener en el envase bien cerrado, en un lugar seco a temperatura por debajo de 25ºC.
Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.
Conservação: Armazenar em recipientes bem fechados, em local seco, com temperatura abaixo de 25 °C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Distribuido por / Responsável pela colocação em circulação:
Vetoquinol Especialidades Veterinarias, S.A.,
Cira de Fresneral, nº 24, Edificio Europe I, 28108
Madrid-España, ESP 28000008, www.vetoquinol.es
Vetoquinol, Lda. Rua Consiglieri Pedroso, 123 – Edifício H
2730-056 BARCARENA PTSAA1991T - V-PAA51198
Fabricado por / Fabricante:
Vetoquinol N.-A. inc., 780 St-Henri, Princeville, Canada G6L 4X1
Acuerdo CA nº / Número do contrato-CA: ABP-90
Importador / Importador: ci-FR-70-321-001
No apto para el consumo humano / Não destinado ao consumo humano

INDICACIONES DE USO / UTILIZAÇÃO:

CALF-LYTE PLUS se usa en terneros en caso de riesgo de trastornos digestivos (diarrea), durante los mismos y durante la recuperación. La combinación de acetato de sodio, electrolitos y dextrosa es un pienso dietético complementario hipertónico (490mOsm / l) para terneros con trastornos digestivos (diarrea). Una vez reconstituida la solución no interfiere con la digestión de la leche y se puede dar a terneros lactantes y a terneros que están siendo alimentados manualmente con leche.
CALF-LYTE® PLUS é adequado para utilização em vitelos para a prevenção e tratamento dos transtornos digestivos (diarreia) ou convalescença das mesmas. A combinação do acetato de sódio, eletrólitos e dextrose é um alimento dietético complementar hipertónico (490mOsm/l) para vitelos com distúrbios digestivos (diarreia). Após a reconstituição a solução não interfere com a digestão do leite e pode ser dado aos vitelos amamentados ou em vitelos alimentados à mão.

ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRAÇÃO:

Terneros / Vitelos:
Disolver 1 bolsa (90g) en 2 litros en agua caliente (37 °C) y administrar con biberón o sonda gástrica. Administrar 2 litros de la solución fresca de 2 a 3 veces al día, exclusivamente o con la dieta habitual (leche o leche de reemplazo).
Dissolver uma saqueta (90g) em 2 litros de água morna (37°C) e administrar por garrafa ou sonda gástrica. Administrar 2 litros da solução fresca de 2 a 3 vezes ao dia, exclusivamente ou com uma dieta normal (leite ou leite de substituição).

PERIODO DE UTILIZACIÓN / PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:

1 a 7 días si se alimenta con dieta habitual.
1 a 3 días si constituye el alimento exclusivo, seguido por un día de transición asociando una dieta habitual y CALF-LYTE PLUS.
1 a 7 dias, se alimentado com dieta normal.
1 a 3 dias, se alimentado exclusivamente, seguido por uma transição de um dia associando dieta regular e CALF-LYTE® PLUS.

Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización. No disolver la bolsa en menos de 2 litros de agua.

Recomenda-se a consulta a um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização. Não dissolver uma saqueta em menos de 2 litros de água.