

# Ionidiar complex

Estabilizador del equilibrio hídrico electrolítico en polvo hidrosoluble oral



1. Advertencia

La información disponible en esta página se corresponde con la legislación y textos vigentes en España. Para todos los demás países debe consultarse la información nacional específica o consultar con el Departamento de Exportación.

\*El contenido de esta página es puramente informativo. Para una correcta utilización de los productos, consultar las indicaciones en la ficha técnica.

## Información rápida del producto

| Principio(s) activo(s)                                                                                                                         | Vía de administración y posología* | Tiempo de espera | Presentación                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Gluconato de calcio<br>Sulfato de magnesio<br>Fosfato de potasio<br>Cloruro de sodio<br>Dextrosa<br>Glicina<br>Bicarbonato de sodio<br>Pectina | Vía oral en el agua de bebida      | Cero días        | 1 kg (10×100 g)<br>5 kg (5×1 kg) |

## Disponibilidad en los países

Chile, Hungary, South Korea, Spain, Turkey.

Si su país no se encuentra en la lista, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de exportación.

[Contactar](#)

## Principio(s) activo(s)

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Gluconato de calcio ..... | 1,9 g/100gr |
| Sulfato de magnesio ..... | 0,7 g/100gr |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Fosfato de potasio .....  | 7,7 g/100gr  |
| Cloruro de sodio .....    | 9,0 g/100gr  |
| Dextrosa .....            | 54,0 g/100gr |
| Glicina .....             | 18,0 g/100gr |
| Bicarbonato de sodio..... | 2,7 g/100gr  |
| Pectina .....             | 6,0 g/100gr  |

**Indicaciones**

Está indicado en caso de riesgo de trastornos digestivos (diarrea), durante los mismos y durante al recuperación.

Contiene predominantes electrolitos e hidratos de carbono fácilmente asimilables

**Posología**

**Terneros y potros:** 100 g disueltos en 2 litros de agua templada. 2 tomas al día.

**Lechones, corderos y cabritos :** 20 g disueltos en 300 ml de agua templada. 2 tomas al día.

Periodo de utilización recomendado: entre 1 y 7 días.

**Tiempo de espera**

Cero días.

**Presentación**

Envase con 10 bolsas de 100 g.

Envase con 5 bolsas de 1 kg.

Prescripción veterinaria: No precisa.

Fabricante nº aESP24000089