Panvermin oral 150 mg/g

syva.es/producto/panvermin-oral-150-mg-g/

Área restringida

La información contenida en esta página está destinada a veterinarios y/o profesionales de salud animal con capacidad de prescripción y/o dispensación de medicamentos.

– Confirmo que soy veterinario o profesional de salud animal.

– Entiendo que la información disponible en esta página se refiere exclusivamente a productos y autorizaciones en España. La información en otros países, debo consultarla a través de los medios oficiales disponibles en el destino específico o con el Departamento de Exportación.

Antiparasitario

Antihelmíntico en polvo para solución oral

1. Advertencia

La información disponible en esta página se corresponde con la legislación y textos vigentes en España. Para todos los demás países debe consultarse la información nacional específica o consultar con el Departamento de Exportación.

*El contenido de esta página es puramente informativo. Para una correcta utilización de los productos, consultar las indicaciones en la ficha técnica.

Información rápida del producto

Principio(s) activo(s)	Vía de administración y posología*	Tiempo de espera	Presentación
Levamisol (hidrocloruro)	Oral en el agua de bebida o en el pienso.	Carne: Bovino, porcino y ovino: 14 días Aves: 7 días Huevos: no usar. No usar en las 4 semanas anteriores al inicio de la puesta. Leche: no usar en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano.	Caja con 10 bosas de 100 g Caja con 5 bolsas de 1 kg Caja con 25 bolsas de 1 kg.

Disponibilidad en los países

Spain.

Si su país no se encuentra en la lista, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de exportación.

Contactar

Ver más sobre este producto

Principio(s) activo(s)

Levamisol (hidrocloruro) .....150 mg/g

Indicaciones

Tratamiento de nematodosis gastrointestinales y pulmonares producidas por nematodos sensibles al levamisol, tanto formas adultas como larvarias:

Bovino y ovino:
– Nematodos gastrointestinales: *Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Ostertagia spp.* (excepto larvas inhibidas), *Haemonchus spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp.; Oesophagostomum spp. Chabertia spp.*
– *Nematodos pulmonares: Protostrongylus spp., Dictyocaulus spp.*

Porcino:
– Nematodos gastrointestinales: *Ascaris suum., Strongyloides ransomi., Oesophagostomum spp,*
– Nematodos pulmonares: *Metastrongylus spp.*

Aves:
– Nematodos gastrointestinales: *Ascaridia columbae, Capillaria spp., Heterakis spp., Amidostomum spp.*

Posología

Bovino, porcino y ovino: 0,5 g/10 kg p.v. en dosis única. No usar en el último tercio de la gestación.

Bovino: No sobrepasar la dosis de 15 g.

Porcino: A partir de 150 kg, administrar 2,3 g por cada 50 kg que sobrepase ese peso.

Ovino: No sobrepasar la dosis de 3 g.

Aves: 1,5 g/10 kg p.v. en el agua de bebida durante 1 día.

Tiempo de espera

Carne:

Bovino, ovino y porcino: 14 días.

Aves: 7 días.

Leche: No usar.

Huevos: No usar. No usar en las 4 semanas anteriores al inicio de la puesta.

Presentación

Envases con 1 kg (10×100 g), 5 kg (5×1 kg) y 25 kg (25×1 kg).

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 349 ESP

¿Necesitas más información?

¡Contacta con nosotros!