

Hepatoren

Complemento
dietético



s.p.[®] veterinaria

Hepatoren



Alimento complementario en forma de solución oral

COMPOSICIÓN POR LITRO

L-Carnitina clorhidrato.....	50 g
DL-Metionina.....	15 g
L-Lisina monoclorhidrato.....	10 g
Colina (cloruro).....	50 g
Vitamina B12.....	10 mg
Manitol.....	65 g
Cloruro de sodio.....	100 g
Cloruro de potasio.....	75 g
Sorbitol.....	100 g

L-Carnitina es un factor fundamental en la movilización, transporte, oxidación y excreción de ácidos grasos, actividad reforzada por la presencia de **Lisina, Metionina y Colina**.

La Vitamina B12 tiene un papel vital en el metabolismo de los ácidos grasos para el mantenimiento de la mielina, así como en la formación de los glóbulos rojos y el funcionamiento del sistema nervioso.

Las sales de Sodio y Potasio, junto a Manitol y Sorbitol le confieren propiedades diuréticas, facilitando la eliminación de los metabolitos resultantes de la actividad hepática.

ESPECIES DE DESTINO

Aves y mamíferos (Todas las especies).

INDICACIONES

Formulación nutricional con propiedades hepatoprotectoras, diuréticas y reguladoras de la energía:

- Prevención y tratamiento de Hígado graso – Síndrome hemorrágico en aves de puesta.
- Prevención y tratamiento de esteatosis lipídica en broilers.
- Prevención y tratamiento de enfermedad del hígado graso en mamíferos.
- Estimulante de las Producciones y del Crecimiento.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Administración Oral en el agua de bebida.

Prevención de Hígado graso – Síndrome hemorrágico en aves de puesta:

1 ml / L de agua de bebida / día durante 5 días.

Repetir el tratamiento cada 3 / 4 semanas, empezar a las 20 – 30 semanas de vida.

Prevención de esteatosis lipídica en broilers:

1 ml / L de agua de bebida / día durante 5 días.

Repetir el tratamiento cada 2 semanas cuando sea necesario, hasta la desaparición total de los síntomas.

Tratamiento curativo en todas las especies:

1 ml / L de agua de bebida / día durante 7 – 10 días.

Posterior a largos tratamientos con antibióticos o coccidiostatos, después de vacunaciones, intoxicación:

1 ml / L de agua de bebida / día durante 5 días.

Stress Térmico:

1 ml / L de agua de bebida los días que sea necesario.

Preparar suficiente agua para el consumo durante la mañana en los días calurosos.

PRECAUCIONES Y TIEMPO DE ESPERA

HEPATOREN es bien tolerado por todas las especies de destino.

No requiere tiempo de espera, producto de uso para nutrición animal.

Almacenar a una temperatura entre 8° y máximo 30 °C

PRESENTACIÓN

100 ml

5 L



 **s.p.® veterinaria, s.a.**

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1 • 43330 RIUDOMS (Tarragona)
Tel. +34 977 850 170* • Fax +34 977 850 405 • Ap. Correos, 60
www.spveterinaria.com

La información que contiene este folleto ha estado revisada por nuestro equipo técnico y pretende complementar el consejo del profesional veterinario. Para la información completa contacte con nuestros comerciales de zona o a la sección de productos de nuestra página web www.spveterinaria.com