# TABERNIL SULFA 40/10 mg/ml solución

## Coccidiostático en solución oral para administrar en el agua de bebida

COMPOSICIÓN:

| | |
|---|---|
| Sulfaquinoxalina | 40 mg |
| Pirimetamina | 10 mg |
| Excipiente c.b.p. | 1 ml |

PROPIEDADES:

En **TABERNIL SULFA** se asocian dos principios activos con efectos sinérgicos; la sulfaquinoxalina, que actúa como antagonista del ácido paraaminobenzoico, suprimiendo la síntesis del ácido tetrahidrofólico esencial para los coccidios, y la pirimetamina, derivado de la pirimidina, antagonista del ácido fólico, que actúa como inhibidor de la dihidrofolatorreductasa.

INDICACIONES:
Tratamiento de coccidiosis producidas por protozoos de los géneros *Eimeria* spp. e *Isospora* spp.

**ESPECIES DE DESTINO:** Aves (aves ornamentales). No administrar a palomas.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:
**TABERNIL SULFA** se administra en el agua de bebida a la dosis de 1,5 ml/litro, equivalente a 3 gotas por cada 100 ml de agua, durante 3 días seguidos, descansar 2 días (agua sin medicar) y seguir con 3 días más de tratamiento.
Se debe preparar diariamente el agua medicada.

**Presentación comercial:** Frasco gotero de 20 ml.

**Nº de Registro:** 963 ESP