


Larvicida y adulticida en suspensión concentrada

Plaga



Aplicación



Larvigen MAX



Composición (Suspensión concentrada)
Alfacipermetrina 3,00 % ; Diflubenzuron 3,00 %

Dosis: 10 ml / 1 litro de agua para tratar 10m²

Espectro de acción

Larvas de Moscas

Haematobia irritans
Stomoxys calcitrans
Musca autumnalis
Hippobosca equina
Musca domestica
Eristalix tennix
Hydrotaea irritans
Psychoda spp

Larvas de Escarabajos

Alphitobius diaperinus

Moscas

· *Musca domestica*
· *Haematobia irritans*
· *Stomoxys calcitrans*
· *Eristalix tennix*
· *Fannia canicularis*
· *Psychoda spp.*

Mosquitos

· *Culex spp.*
· *Aedes spp.*
· *Anopheles spp.*

Pulgas y Piojos

· *Linognathus spp.*
· *Haematopinus spp.*
· *Solenopotes spp.*
· *Eomenacanthus spp.*

Larvas de Mosquitos

Aedes aegypti
Aedes albopictus

Larvas de Pulgas

Ctenocephalides canis (Pulga del perro)
Ctenocephalides felis (Pulga del gato)
Pulex irritans (Pulga del humano)
Xenopsylla cheopis (Pulgas de la rata)
Ceratophyllus gallinae (Pulga de las aves)
Spilopsyllus cuniculi (Pulga del conejo)

Ácaros

· *Dermanyssus gallinae*
· *Cheyletiella spp.*
· *Sarcoptes scabiei*
· *Psoroptes bovis*
· *Chorioptes bovis*
· *Chinchorros*
· *Ornithodoros spp.*

Garrapatas

· *Ixodes spp.*
· *Rhipicephalus spp.*
· *Dermacentor spp.*
· *Haemaphysalis spp.*

Tábanos

· Fam. Tabanidae

Especialmente indicado

Propiedades

- Insecticida Larvicida inhibidor del crecimiento de huevos y larvas de insectos.
- Insecticida adulticida piretroide de última generación con gran efecto de choque.
- Actúa frente a la plaga en todas las fases de su ciclo de vida.

Modo de empleo

Pulverizar sobre suelos y paredes donde habitan animales. Tratar los rincones con materia orgánica y a lo largo de zonas donde queden restos de estiércol.

Ventajas

- Larvicida y adulticida en un solo uso
- Gran ahorro de tiempo en la aplicación
- Seguro para animales

Registro

Zoosanitario: 03220-P

Presentaciones

