

Maggots



Composición (Granulado soluble)
Ciromazina 2,00%

Larvicida - IGR - en gránulos solubles

Plaga



Larva de mosca



Larva de mosquito



Larva de Alphitobius

Aplicación



Esparcido en seco



Pulverizado

Dosis: 250 g para tratar 10m²

- **Esparcido en seco:** 250 g → 10 m²
- **Pulverización:** 250 g /2-4 litros de agua → 10 m²
- **Riego o Baldeo:** 250 g/10 litros de agua → 10 m²

Espectro de acción



Larvas de Moscas

Haematobia irritans
Stomoxys calcitrans
Musca autumnalis
Hippobosca equina
Musca domestica
Eristalix tennix
Hydrotaea irritans
Psychoda spp

Larvas de Mosquitos

Aedes aegypti
Aedes albopictus

Larvas de Escarabajos

Alphitobius diaperinus

Larvas de Pulgas

Ctenocephalides canis (Pulga del perro)
Ctenocephalides felis (Pulga del gato)
Pulex irritans (Pulga del humano)
Xenopsylla cheopis (Pulgas de la rata)
Ceratophyllus gallinae (Pulga de las aves)
Spilopsyllus cuniculi (Pulga del conejo)



Especialmente indicado

Propiedades

- Insecticida Larvicida inhibidor del crecimiento de huevos y larvas de insectos
- Reduce la población de insectos de manera exponencial.
- Esencial para el control integral de insectos.
- Interrumpe la muda de larvas y la pupación.

Modo de empleo

Esparcido: Purines, estiércol líquido, fosas sépticas de instalaciones ganaderas; Esparcir directamente a las dosis recomendadas.

Pulverizado: Estiércol sólido, boxes, camas: Diluir en agua y aplicar.

Combinar con adulticida para un control total de los insectos.

Ventajas

- Control eficaz de la población de insectos: 80-90%
- Facilidad de uso y aplicación
- Muy seguro para los animales
- Mejora las condiciones de trabajo del personal

Registro

Zoosanitario: 02804-P

Presentaciones



5 Kg



10 Kg

