Disinfection

Technical Data Sheet

Dismozon® plus

Descripción general del producto

Dismozon® plus es un desinfectante de productos sanitarios basado en oxígeno activo, especialmente desarrollado para la desinfección de alto nivel de superficies delicadas y con amplio espectro de eficacia.

Dismozon® plus lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. Dismozon® plus está clasificado como producto sanitario clase llb (TÜV 0482).

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Dismozon® plus que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Dismozon® plus quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

Aplicaciones/Indicaciones

Dismozon® plus es adecuado para la limpieza y desinfección de alto nivel de superficies lavables de productos sanitarios en una amplia variedad de áreas médicas.

Gracias a su amplia actividad microbiológica y la sustancia activa específica (Monoperoxifalato de magnesio hexahidratado, MMPP) es recomendable para uso rutinario y terminal en áreas sensibles y cercanas al paciente, como:

- Salas de operación
- Unidades obstétricas y de cuidado intensivo
- Desinfección de equipos médicos altamente sensibles

Ventajas

Propiedades del producto:

- Aroma suave y agradable
- Bajo cantidad de residuos
- Excepcionalmente amplia compatibilidad de materiales
- Suministrado en prácticos sobres en formato gránulos

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.

Disinfection

Technical Data Sheet

Dismozon® plus

Instrucciones de uso

Dismozon® plus se suministra como un granulado.
La solución de trabajo debe renovarse cada día y también, si está altamente contaminada, para asegurar el nivel de oxígeno activo necesario para la total efectividad microbiológica del producto con el tiempo de aplicación descrito.
Disolver por completo el contenido de un sobre en agua siempre fría (o máximo a temperatura ambiente).
No mezclar con agentes limpiadores. Proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación. Se puede minimizar la formación del olor utilizando agua desionizada (desmineralizada).
Los productos sanitarios, (ej. tonómetros de aplanación) necesitan ser enjuagados con agua después de la desinfección.

Nota:
Las superficies visiblemente contaminadas con sangre u otros organismos, necesitan limpiarse antes de usar agentes liberadores de oxígeno, de lo contrario su efecto puede reducirse.

Compatibilidad de uso

Las soluciones de uso de Dismozon® plus se probaron para su compatibilidad en una variedad de materiales, incluyendo:

- Metales: acero inoxidable (V4A), aluminio
- Plásticos: poliamida, polietileno, polipropileno, poliestireno, pvc, goma, Makrolon®, Plexiglas®, Teflon®, polisulfona, polioximetileno, poliuretano, látex, silicona, linóleo, Viton®

Cuando se usa según instrucciones, no se esperan daños en materiales.

Con cobre, latón y bronce, es necesario probar la idoneidad del producto en un área oculta antes del primer uso.

Eficacia del producto

Bacterias y Hongos					
Eficacia en	**Espectro**	**Normativa**	**Concentraciones**		**Tiempo de exposición**
EN	Bactericida	EN 13727	2,0 g/L	0,2 %	30 minutos
Fase 2 / Paso 1			4,0 g/L	0,4 %	5 minutos
	Levuricida	EN 13624	3,0 g/L	0,3 %	1 hora
			4,0 g/L	0,4 %	30 minutos
	Fungicida	EN 13624	24,0 g/L	2,4 %	1 hora
	Tuberculicida/ Micobactericida	EN 14348	8,0 g/L	0,8 %	4 horas
			12,0 g/L	1,2 %	2 horas
			32,0 g/L	3,2 %	1 hora
VAH	Bactericida / Levuricida	VAH	3,0 g/L	0,3 %	1 hora
		VAH	5,0 g/L	0,5 %	30 minutos

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.

Recomendaciones certificadas para desinfección de superficies			30,0 g/L	3,0 %	5 minutos
RKI Sustancia reconocida para descontaminación de acuerdo con Art. 18 lfSG	Área A - Bacteria (incl. Micobacteria), hongos y esporas	RKI	36,0 g/L	3,6 %	4 horas
Esporas					
EN Fase 2 / Paso 1	Esporicida *B.subtilis*	EN 13704	16,0 g/L	1,6 %	2 horas
			20,0 g/L	2,0 %	1 hora
	Esporicida *C. difficile*	EN 13704	24,0 g/L	2,4 %	15 minutos
Virus					
EN 14476 Fase 2 / Paso 1	Virucida	EN 14476	4,0 g/L	0,4 %	1 hora
			12,0 g/L	1,2 %	30 minutos
	Virucida contra virus encaps.	EN 14476	2,0 g/L	0,2 %	2 minutos
Eficacia contra virus no encapsulados	Adenovirus	EN 14476	2,0 g/L	0,2 %	5 minutos
	Poliovirus	EN 14476	4,0 g/L	0,4 %	1 hora
			12,0 g/L	1,2 %	30 minutos
	Norovirus Murino (MNV)	EN 14476	2,0 g/L	0,2 %	30 minutos
			4,0 g/L	0,4 %	15 minutos
			8,0 g/L	0,8 %	5 minutos
	Rotavirus	EN 14476	2,0 g/L	0,2 %	1 minuto
DVV Eficacia contra virus	Virucida	DVV	4,0 g/L	0,4 %	2 horas
			8,0 g/L	0,8 %	1 hora
	Virucida contra virus encaps. (incl. VHB, VIH, VHC)	DVV	1,0 g/L	0,1 %	30 minutos
			2,0 g/L	0,2 %	5 minutos
Eficacia contra virus no encapsulados	Adenovirus	DVV	2,0 g/L	0,2 %	15 minutos
			4,0 g/L	0,4 %	5 minutos
	Poliomavirus	DVV	2,0 g/L	0,2 %	1 hora
			4,0 g/L	0,4 %	15 minutos
	Poliovirus	DVV	4,0 g/L	0,4 %	2 horas
			8,0 g/L	0,8 %	1 hora
RKI Sustancia reconocida para descontaminación de acuerdo con Art. 18 lfSG	Área B – Virus encaps. y no encaps.	RKI	36,0 g/L	3,6 %	15 minutos

VAH: Asociación de Higiene Aplicada
RKI: Instituto Robert Koch
DVV: Sociedad Alemana para el Control de Enfermedades Víricas

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.

Disinfection

Technical Data Sheet

Dismozon® plus

Composición del producto

Ingredientes activos:
Monoperoxiftalato de magnesio hexahidratado (MMPP) 958 mg/g

Propiedades específicas del producto:
Apariencia: gránulos blancos
Densidad: 500 g/L
Solubilidad en agua: soluble

Látex: no contiene látex.

Presentación

Producto	Formato	Unidades/caja	Ref. HARTMANN
Dismozon® plus	16 g por sobre	100 sobres	981187

Aspectos de seguridad

Primeros auxilios:
En caso de contacto con la piel: lavar enseguida con agua y jabón, enjuagando bien.
Visitar al médico si existe escozor continuado de piel. En caso de contacto con los ojos: enjuagar los ojos bajo agua corriente durante varios minutos. Avisar inmediatamente al médico.
En caso de ingestión: enjuagar la boca y beber mucha agua. Consultar al médico en caso de achaques persistentes.
Irrita piel, mucosas y ojos. No se conoce ningún efecto sensibilizador.

Para más información consulte la ficha de seguridad del producto.

Etiquetado

Fecha de caducidad:

ej.: ⌛ 2019 04
Año mes

Caducidad del producto: 3 años.
Caducidad tras la apertura del producto: 12 meses.

Acondicionamiento

Se presenta en cajas de 100 sobres.

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco.

Este documento es propiedad de Laboratorios HARTMANN S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de copias no autorizadas.