

# Pedigree Comida húmeda para Perros en Gelatina Sabores Pollo y Cordero Multipack 4x100g

## INFORMACIÓN NUTRICIONAL –

<b>Listado de ingredientes</b>	Composición: Con pollo - carnes y subproductos animales (39%, incluye 4% pollo), sustancias minerales, subproductos de origen vegetal (incluye 0,5% pulpa de remolacha desecada), aceites y grasas (incluye 0,5% de aceite de girasol), extractos de proteínas vegetales. Con cordero - carnes y subproductos animales (39%, incluye 4% cordero), sustancias minerales, subproductos de origen vegetal (incluye 0,5% pulpa de remolacha desecada), aceites y grasas (incluye 0,5% de aceite de girasol), extractos de proteínas vegetales.
<b>Composición analítica</b>	Constituyentes analíticos (%): proteína: 7 / contenido en grasa: 6 / materia inorgánica: 2 / fibras brutas: 0,3 / humedad: 82,5 / calcio: 0,35 mg
<b>Aditivos nutricionales</b>	Aditivos por kg: Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 150 UI, Vitamina E (alfa-tocoferoles): 50 mg, Iodato de calcio anhídrido: 0,39 mg, Sulfato cúprico pentahidratado: 5,7 mg, Sulfato Ferro monohidratado: 10 mg, Sulfato de manganeso monohidratado: 5,6 mg, Sulfato de zinc monohidratado: 107 Aditivos tecnológicos: Goma casia: 2100 mg
<b>Guía de Alimentación Petcare</b>	Solo Comida Humeda: Para un perro adulto (> 1 año), dar al día: 3 1/2 bolsitas para un perro de 5kg; 6 bolsitas para un perro de 10kg; 10 1/2 bolsitas para un perro de 20kg; Comida Humeda y Pienso: Para un perro adulto (> 1 año), dar al día: 2 bolsitas + 40g de pienso para un perro de 5kg; 3 bolsitas + 75g de pienso para un perro de 10kg; 5 bolsitas + 125g de pienso para un perro de 20kg;
<b>Indicaciones de Seguridad Petcare</b>	Se recomienda ajustar la cantidad de alimento según la actividad física, raza y edad el perro. Deja una fase de transición cuando le des una comida nueva. ¿Cómo alimentar a tu perro?. Visita nuestra web o llama al Servicio de Atención al Consumidor. Deja siempre agua fresca disponible. Servir a temperatura ambiente. Una vez abierto conservar en frigorífico y consumir antes de 2 días.