

# Renaldine®

Cuidado renal integral

## Renaldine® powder (polvo)

70g y 240g

- Vía oral.
- Existen 2 medidas para dosificar el producto: cacito pequeño (0,5 gramos) y cacito grande (2 gramos).
- Dosis máxima 5 cacitos al día. Ver tabla.
- El producto se mezcla mejor con el pienso húmedo.

En caso de dieta seca humedecer ligeramente las croquetas para asegurar una buena adherencia del polvo y su completa ingestión.



Peso	1-2,5 kg	2,5-5 kg	5-7,5 kg
Cacito pequeño	1/día	2/día	3/día

Peso	7,5-10 kg	11-20 kg	21-30 kg	31-40 kg	>40 kg
Cacito grande	1/día	2/día	3/día	4/día	5/día

## Renaldine® pasta

30ml

- Administrar directamente en la boca o mezclar con su alimento habitual, a razón de 2 ml de pasta por cada 5 kg de peso corporal una vez al día.



Peso	1-5 kg	5-10 kg	11-15 kg	20 kg
Cantidad	2 ml/día	4 ml/día	6 ml/día	8 ml/día

Para perros mayores de 20 kg se recomienda el uso de Renaldine® powder.

### En ambos productos:

- Se pueden administrar ininterrumpidamente de por vida.
- El animal debe tener acceso al agua en todo momento.
- Sólo se debe interrumpir si hay un aumento de iCa (calcio activo libre) sostenido, por encima de los valores de normalidad.
- Debe administrarse con comida. La disminución del pH estomacal potencia la actividad de Renaldine®.
- (\*) En estadios 3 o 4 de la clasificación IRIS y en función de los parámetros laboratoriales, cuando necesitemos una rápida recuperación de la función renal se recomienda repartir la dosis recomendada en dos tomas diarias coincidiendo con las comidas, durante los dos primeros meses hasta estabilizar al paciente.

una toma al día\*

